

Información al paciente

Prevención de Endocarditis Bacteriana

La **Endocarditis Bacteriana** es una infección grave sobre estructuras valvulares o anomalías de su corazón. El riesgo de presentar esta enfermedad es mayor en las siguientes cardiopatías:

- ✓ Prótesis valvular biológica, mecánica o tubos valvulados.
- ✓ Endocarditis infecciosa previa.
- ✓ Determinadas cardiopatías congénitas.

Cuando se realizan algunas exploraciones dentales que para individuos sanos no entrañan ningún peligro, en este tipo de cardiopatías existe riesgo de infección sobre el corazón. Por eso ante procedimientos dentales que impliquen la manipulación de la región gingival o periapical de los dientes o la perforación de la mucosa oral, se recomienda la prevención de endocarditis con la siguiente pauta de antibióticos:

- ✓ **Amoxicilina o Ampicilina:**
 - **Adultos:** 2 gr vía oral o intravenoso como dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento.
 - **Niños:** 50 mg/kg de peso vía oral o intravenoso como dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento.
- ✓ **Si fuese alérgico a la Penicilina o Ampicilina:**
 - **Adultos:** Clindamicina 600 mg vía oral o intravenosa como dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento.
 - **Niños:** CLINDAMICINA 20 mg/kg de peso vía oral o intravenosa como dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento.

Es importante recordar que la mejor prevención de endocarditis consiste en la correcta higiene dental diaria.